

No.	年齢	性別	疾患名	使用治験剤	処方	開始日	判定	所見
1	TM 60	♀	不安神経症	グミ K・リゾレシチン	3T / 3X 食前	14.4.30	著効 5	多彩な不定愁訴 2週間後から次第に改善
2	KY 39	♀	不安神経症 (更年期障害)	グミ K・リゾレシチン	3T / 3X	14.5.10	著効 5	いらいら、顔面フラッシュ、冷感、冷え 4週間後、症状消失
3	KK 59	♀	不安神経症 うつ状態	グミ K・リゾレシチン	3T / 3X	14.5.10	やや有効 3	多彩な不定愁訴あり、被害妄想あり、 4週間で症状はほぼ消失 出社拒否はまだ解消していない
4	IM 66	♂	初老性うつ病 脳内出血 左半身マヒ	グミ K・リゾレシチン	9T / 3X	14.4.20	著効 5	不安感、いらいら感あり、暴言を吐く 2週間後、ほぼ消失
5	II 64	♀	初老期うつ傾向	グミ K・リゾレシチン	6T / 3X	14.4.20	有効 4	不安感、うつうつ感あり 2週間後、ほぼ消失
6	IN 94	♀	老人性うつ病	グミ K・リゾレシチン	3T / 3X	14.4.20	有効 4	不安感、いらいら感あり 2週間後、ほぼ消失
7	IK 21	♀	思春期うつ病	グミ K・リゾレシチン	3T / 3X	14.5.31	有効 4	不安感、いらいら感あり 2週間後、ほぼ消失
8	FK 46	♂	うつ傾向	グミ K・リゾレシチン	3T / 3X	14.6.15	有効 4	不安感、うつうつ感あり 2週間後、ほぼ消失
9	FY 37	♀	うつ傾向	グミ K・リゾレシチン	3T / 3X	14.6.15	有効 4	不安感、いらいら感、ゆううつ感あり 2週間後、ほぼ消失
10	KT 56	♀	不安神経症 卵巣摘出 自律神経失調症	グミ K・リゾレシチン	3T / 3X	14.6.21	やや有効 3	ほてり、突然発汗、いらいら感あり 2週間後、情緒不安定、いらいら感改善 突然の発汗は改善せず
11	YT 39	♀	不安神経症 更年期障害 うつ状態	グミ K・リゾレシチン	6T / 3X	14.6.25	有効 4	夫とのコミュニケーション不調の為、ゆううつ、いらいら 2週間後ゆううつが次第に改善 4週間後、気分がかなり良くなる
12	NS 66	♀	不安神経症 心房細動 脳塞栓	グミ K・リゾレシチン	3T / 3X	14.7.19	著効 5	情緒不安定、心臓発作を恐れ、身体不自由により不安、いらいら 2週間後、気持ちが落ち着き、K・リゾレシチン継続を熟望する
13	OM 71	♂	老年性うつ病 糖尿病 本態性高血圧症	グミ K・リゾレシチン	3T / 3X 6T / 3X	14.7.19 14.9.13	著効 5	いらいらして暴言を吐く 2週間で改善、血圧安定、糖尿コントロール改善
14	TA 60	♀	初老性うつ傾向 脾臓ガン	グミ K・リゾレシチン	3T / 3X	14.8.6	有効 4	不安感、うつうつ感あり 2週間後、気分の落ち込み軽減
15	TN 55	♀	不安神経症 うつ傾向	グミ K・リゾレシチン	3T / 3X	14.8.6	著効 5	気分ゆううつ、落ち込み気分、いらいら感 2週間後、症状消失
16	KS 58	♂	不安神経症 本態性高血圧症 上室性期外収縮	グミ K・リゾレシチン	3T / 3X	14.8.13	著効 5	いらいら、不安感強く、血圧の変動大 200 / 110 前後になり、動悸感強く、突然死の不安あり 4週間で不安消失、血圧安定
17	TT 61	♀	不安神経症 傷害後うつ病	グミ K・リゾレシチン	3T / 3X	14.8.13	有効 4	多彩な不定愁訴あり、不安感、いらいら 4週間後、ほぼ消失
18	IR 22	♀	不安神経症 思春期うつ傾向	グミ K・リゾレシチン	3T / 3X	14.8.13	有効 4	過食症あり、うつ気分が強い 4週間で症状はほぼ消失

No.	年齢	性別	疾患名	使用治療剤	処方	開始日	判定	所見
19	HH 62	♂	不安神経症 うつ病 肺ガン手術	グミ K・リゾレシチン	3T / 3X	14.8.20	著効 5	肺ガンの再発不安感、うつ状態、不眠、いろいろ 4週間後、不安軽減、いろいろ感解消、高血圧安定
20	KM 65	♀	不安神経症 乳ガン手術 癩痕萎縮傷害	グミ K・リゾレシチン	3T / 3X	14.8.27	著効 5	上肢の痛み強く、再発不安の為、ゆううつ、いろいろ 感がひどい 2週間後、ゆううつ、いろいろ感がかなり改善、うつ 状態解消
21	FT 72	♀	老年性うつ症 小脳梗塞複視	グミ K・リゾレシチン	3T / 3X	14.8.30	有効 4	不安感、気分の落ち込みが強く、多彩な不定愁訴あり 4週間で不安感、うつ状態は消失
22	KE 59	♀	不安神経症 初老性うつ病 乳癌切除	グミ K・リゾレシチン	3T / 3X	14.8.30	有効 4	家庭内のイザコザで著しい気分の落ち込みがあり、 多彩な不定愁訴 4週間で落ち込み、不定愁訴消失
23	FI 69	♀	不安神経症 うつ傾向 皮膚ガン	グミ K・リゾレシチン	3T / 3X	14.8.30	有効 4	気分の落ち込み、いろいろ感あり 4週間後うつ状態解消
24	FK 38	♀	うつ病	グミ K・リゾレシチン	3T / 3X	14.8.30	やや有効 3	うつ症状著しい、気まぐれ 4週間後、うつ状態がやや改善された
25	MM 59	♀	不安神経症 胃ガン切除	グミ K・リゾレシチン	3T / 3X	14.9.10	有効 4	うつ状態、胃ガンの再発不安あり 4週間後、不安解消、うつ傾向改善
26	BM 30	♀	不安神経症 うつ傾向	グミ K・リゾレシチン	3T / 3X	14.9.10	有効 4	職場の人間関係がうまくいかず、偏頭痛、いろいろ 気分、ゆううつ 2週間で症状改善
27	NR 69	♀	不安神経症 うつ病 子宮ガン	グミ K・リゾレシチン	3T / 3X	14.9.13	著効 5	うつ状態、いろいろ、再発不安が強い 4週間後、症状消失 トランキライザーはもういらぬと言う
28	MU 40	♀	不安神経症 うつ傾向 乳ガン	グミ K・リゾレシチン	3T / 3X	14.9.17	有効 4	うつ状態、不安感、落ち込み 2週間後、症状消失
29	NT 67	♀	不安神経症 初老性うつ病	グミ K・リゾレシチン	6T / 3X	14.9.17	有効 4	うつ状態、不安感、気分の落ち込み 2週間後、症状消失
30	UH 49	♀	不安神経症 乳ガン切除 うつ傾向	グミ K・リゾレシチン	6T / 3X	14.9.27	やや有効 3	多彩な不定愁訴あり、乳ガンの再発を常に恐れ、い らいら当り散らす 4週間後もあまり変わらずだが、多少減少
31	TT 81	♀	不安神経症 老人性うつ病	グミ K・リゾレシチン	3T / 3X	14.9.27	有効 4	気分落ち込み、不安感強くいろいろする 2週間後でうつ状態改善
32	OS 75	♀	不安神経症 老年期うつ病	グミ K・リゾレシチン	3T / 3X	14.9.27	やや有効 3	不定愁訴が多い、初老性うつ病で気分の落ち込みが 強い 2週間でうつ気分解消する
33	MT 87	♀	不安神経症 老人性うつ症状 パーキンソン症	グミ K・リゾレシチン	3T / 3X	14.9.30	有効 4	不安感強く、血圧変動大 4週間後、不安感消失、血圧安定
34	OK 73	♂	不安神経症 脳出血 左半身マヒ	グミ K・リゾレシチン	3T / 3X	14.9.30	著効 5	不安感、いろいろ感あり、暴言を吐く 2週間後、すっかり優しい人物に変身
35	OM 73	♀	不安神経症 うつ傾向 本態性高血圧症	グミ K・リゾレシチン	3T / 3X	14.9.30	著効 5	うつ病による狭心症あり、血圧変動大 夫の介護に伴ういろいろ感あり 2週間後、夫の変身もあり、全て改善
36	OT 52	♂	不安神経症 本態性高血圧症	グミ K・リゾレシチン	3T / 3X	14.9.30	著効 5	不安感による動揺性高血圧あり 2週間後、安定、不安感消失
37	ON 64	♀	不安神経症 心因性狭心症	グミ K・リゾレシチン	9T / 3X	14.9.30	有効 4	不安感による狭心症あり、うつうつ、いろいろ感あ り 4週間後、安定、不安感消失